

⑱ Trastuzumab + SOX療法

患者ID : &tagPatNo& 身長 : tagPatHeight cm
 患者氏名 : &tagPatName& 体重 : tagPatWeight kg
 生年月日/性別 : &tagPatBirth& ##### / 3PatS 体表面積 : #VALUE! m²

主治医 : &tagPatOrdDoc&

【胃がん 投与スケジュール】 1コース：3週間（21日）

成分名	商品名・規格	標準投与量		今回の投与量		投与日
トラスツズマブ	ハーセプチン注射用 60mg/V、150mg/V	初回8mg/kg	#VALUE! mg/body			day1
		2回目以降 6mg/kg	#VALUE!			
オキサリプラチン (L-OHP)	エルプラット点滴静注液 50mg/10mL/V 100mg/20mL/V	130mg/m ²	#VALUE! mg/body			day1
S-1	Iソクタイホウ配合錠T25 Iソクタイホウ配合錠T20	80mg/m ² /day	#VALUE! mg/day			day1(夕) ~ day15(朝)
		体表面積あたり（投与の目安）				
		1.25m ² 未満	: 80mg/day(分2)			
		1.25~1.50m ² 未満	: 100mg/day(分2)			
		1.50m ² 以上	: 120mg/day(分2)			

年 月 日 ()

【Day1】

メインルート

Rp ① div

生食	100	mL
プロイメンド	1	A
デキサート	6.6	mg
	1	A

30分

Rp ② div

生食	50	mL
----	----	----

15分

Rp ③ div

ハーセプチン	0	mg
生食	250	mL

90~30分

※ハーセプチンの初回投与時は、90分かけて点滴静注。初回投与時の忍用性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間まで短縮できる。

Rp ④ div

エルプラット	0	mg
5%ブドウ糖	500	mL

120分

Rp ⑤ div

生食	50	mL
----	----	----

15分

【Day1(夕)~15(朝)】

Rp.1 エスワンタイホウ配合錠 0 mg 2×朝夕食後 14日分