

# ⑫ BEV + IRIS

患者ID : &tagPatNo& 身長 : tagPatHeight cm  
 患者氏名 : &tagPatName& 体重 : tagPatWeight kg  
 生年月日/性別 : &tagPatBirth& ##### / ㄱPatS 体表面積 : #VALUE! m<sup>2</sup>  
 主治医 : &tagPatOrdDoc&

【BEV+IRIS投与スケジュール】 1コース：4週間（28日）

アバスチン 5mg/kg	イリノテカン 100mg/m <sup>2</sup>	TS-1経口投与（2週投与2週休薬）
-----------------	--------------------------------	--------------------

成分名	商品名・規格	標準投与量			今回の投与量		投与日
ペバンスマブ (BEV)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL/V 400mg/16mL/V	5mg/kg	#VALUE!	mg/body		mg/body	day1, 15
イリノテカン (CPT-11)	イリノテカン注 40mg/2mL/V、100mg/5mL/V	100mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!	mg/body		mg/body	day1, 15
TS-1	TS-1 OD錠 20mg/錠 25mg/錠	1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/day(分2)	mg/body		mg/day	day 1~14
		1.25~1.50m <sup>2</sup>	100mg/day(分2)				
		1.50m <sup>2</sup> 以上	120mg/day(分2)				

\_\_\_年 \_\_\_月 \_\_\_日 ( \_\_\_ )

### 【Day1, 15】

	<b>メインルート</b>	
Rp ① div 生食 100 mL プロイメンド 1 A テキサート 6.6 mg <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 50px; height: 10px;"></span> 1 A	↓ 30分	
Rp ② div アバスチン 0 mg 生食 100 mL	↓ 90~30分	※アバスチン初回投与時は90分かけて点滴静注。初回投与時の忍用性が良好であれば2回目の投与は60分間で行ってもよい。また、2回目の投与においても忍用性が良好であれば、それ以降の投与は30分間で投与することができる。
Rp ③ div イリノテカン 0 mg 生食 500 mL	↓ 120分	
Rp ④ div 生食 250 mL	↓ 90分	

### 【Day1~14】

TS-1 OD錠 0 mg 2×朝夕