

# ② BEV + トリフルリジン

患者ID : &tagPatNo& 身長 : tagPatHeightcm  
 患者氏名 : &tagPatName& 体重 : tagPatWeightkg  
 生年月日/性別 : &tagPatBirth& ##### / 3PatS 体表面積 : #VALUE! m<sup>2</sup>  
 主治医 : &tagPatOrdDoc&

【BEV+トリフルリジン投与スケジュール】 1コース：4週間（28日）

アバスチン 5mg/kg	ロンサーフ配合錠経口投与（2週投与2週休薬） 5日間連続内服、2日間休薬を2回繰り返す*
--------------	---

成分名	商品名・規格	標準投与量		今回の投与量		投与日
ペバシスマブ (BEV)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL/V 400mg/16mL/V	5mg/kg	#VALUE! mg/body		mg/body	day 1,15
トリフルリジン (TAS-102)	ロンサーフ配合錠 T15.T20	70mg/m <sup>2</sup> /day	#VALUE! mg/day		mg/day	*参照
		体表面積あたり				
		1.07m <sup>2</sup> 未満 : 35mg/回(70mg/day)				
		1.07~1.23m <sup>2</sup> 未満 : 40mg/回(80mg/day)				
		1.23~1.38m <sup>2</sup> 未満 : 45mg/回(90mg/day)				
		1.38~1.53m <sup>2</sup> 未満 : 50mg/回(100mg/day)				
		1.53~1.69m <sup>2</sup> 未満 : 55mg/回(110mg/day)				
		1.69~1.84m <sup>2</sup> 未満 : 60mg/回(120mg/day)				
		1.84~1.99m <sup>2</sup> 未満 : 65mg/回(130mg/day)				
		1.99~2.15m <sup>2</sup> 未満 : 70mg/回(140mg/day)				
		2.15m <sup>2</sup> 以上 : 75mg/回(150mg/day)				

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 ( \_\_ )

**【Day1.15】**

	<b>メインルート</b>	
Rp ① div		
アバスチン	0 mg	
生食	100 mL	90~30分
Rp ② div		
生食	50 mL	15分

**【Day1~14】**

Rp.1 ロンサーフ配合錠 0 mg 2×朝夕食後 5日間連続内服、2日間休薬を2回繰り返す

※アバスチン初回投与時は90分かけて点滴静注。初回投与時の忍用性が良好であれば2回目の投与は60分間で行ってもよい。また、2回目の投与においても忍用性が良好であれば、それ以降の投与は30分間で投与することができる。