

# ⑥ Enfortumab Vedotin単剤療法

患者ID : &tagPatNo& 身長 : tagPatHeightcm  
 患者氏名 : &tagPatName& 体重 : tagPatWeightkg  
 生年月日/性別 : &tagPatBirth& #### 歳 / gPatS 体表面積 : #VALUE! m<sup>2</sup>  
 主治医 : &tagPatOrdDoc&

【尿路上皮がん 投与スケジュール】 1コース：4週間隔

成分名	商品名・規格	標準投与量		今回の投与量		投与日
エンホルツマブ ベドチン	パドセブ点滴静注用 30mg/V	1.25mg/kg	#VALUE!	mg/body		day1 day8 day15

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 ( \_\_ )

**【Day1,8,15】**

	<b>メインルート</b>	
Rp ① div 生食 50 mL	↓ 15分	※PD-1/PD-L1阻害剤による前治療歴のある患者が適応 ※パドセブ1回量は125mgを超えないこと ※1バイアル注射用水3.3mLに溶解。溶解後の濃度は、10mg/mLとなる 最終濃度は0.3~4.0mg/mLとしてください。
Rp ② div 生食 100 mL パドセブ注 0 mg	↓ 30分以上	
Rp ③ div 生食 50 mL	↓ 15分 (フラッシュ)	