

① R-CHOP

患者ID : &tagPatNo& 身長 : tagPatHeight cm
 患者氏名 : &tagPatName& 体重 : tagPatWeight kg
 生年月日/性別 : &tagPatBirth& ##### / 3PatS 体表面積 : #VALUE! m²
 主治医 : &tagPatOrdDoc&

【R-CHOP投与スケジュール】 1コース：3週間（21日）

| 成分名 | 商品名・規格 | 標準投与量 | | 今回の投与量 | | 投与日 |
|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| リツキシマブ (Rit) | リツキサン注 100mg/10mL/V 500mg/50mL/V | 375mg/m ² | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | day1 |
| シクロホスファミド (CPA) | 注射用エンドキサン 100mg/V | 750mg/m ² | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | day1 |
| ドキシソルピシン (DXR) | アドリアシン注用 10mg/V | 50mg/m ² | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | day1 |
| ビンクリスチン (VCR) | オンコピン注射用 1mg/V | 1.4mg/m ² | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | day1 |
| プレドニゾン (PSL) | プレドニン錠5mg | 66歳以上40mg/m ² 65歳以下 100mg/body | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | #VALUE! mg/body | day 1~5 |

年 月 日 ()

【Day1】

| | | |
|--|-------------|--|
| Rp ① div 生食 100 mL 1 A | ↓ 30分 ↓ | メインルート Day1: イメンド125mg1×朝 Day2、3: イメンド80mg1×朝 |
| Rp ② div リツキサン 0 mg 生食 0 mL | ↓ Dr指示通り ↓ | リツキサンは、初回投与時、最初の30分は50mg/hrで開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後30分毎に注入速度を50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで速度を上げることができる。 二回目以降は、初回投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrにて投与開始し、その後30分毎に100mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで上げることができる。 ★リツキサンの最大投与回数は8回まで★ ★アドリアシンの総投与量は500mg/m ² 以下とする★ ★オンコピンの1回投与量は2mgを超えないものとする★ |
| Rp ③ div アドリアシン 0 mg 生食 50 mL | ↓ 5分 (全開) ↓ | |
| Rp ④ div オンコピン 0 mg 生食 50 mL | ↓ 5分 (全開) ↓ | |
| Rp ⑤ div エンドキサン 0 mg 生食 500 mL | ↓ 120分 ↓ | |
| Rp ⑥ div 生食 100 mL | ↓ 30分 ↓ | |
| 【Day1~5】 プレドニン錠5mg 0 mg/body | | |