

# ②④ XELIRI+BEV

患者ID : &tagPatNo& 身長 : tagPatHeightcm  
 患者氏名 : &tagPatName& 体重 : tagPatWeightkg  
 生年月日/性別 : &tagPatBirth& ##### / 3PatS 体表面積 : #VALUE! m<sup>2</sup>  
 主治医 : &tagPatOrdDoc&

【XELIRI+BEV投与スケジュール】 1コース：3週間（21日）

アバスチン 7.5mg/kg	イリノテカン 200mg/m <sup>2</sup>	ゼローダ経口投与（2週投与1週休薬）
-------------------	--------------------------------	--------------------

成分名	商品名・規格	標準投与量	標準投与量	標準投与量	今回の投与量	投与日
ペバシスマブ (BEV)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL/V 400mg/16mL/V	7.5mg/kg	#VALUE!	mg/body	mg/body	day1
イリノテカン (CPT-11)	イリノテカン注 100mg/5mL/V、40mg/2mL/V	200mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!	mg/body	mg/body	day1
カペシタピン	ゼローダ錠300 300mg/錠	1600mg/m <sup>2</sup> /day	#VALUE!	mg/day	mg/day	day1 (夕) ～ day15 (朝)
		体表面積あたり				
		1.31m <sup>2</sup> 未満		: 1800mg/day(6錠/day)		
		1.31～1.69m <sup>2</sup> 未満		: 2400mg/day(8錠/day)		
		1.69～2.07m <sup>2</sup> 未満		: 3000mg/day(10錠/day)		
		2.07m <sup>2</sup> 以上		: 3600mg/day(12錠/day)		

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 ( \_\_\_\_ )

**【Day1】**

<b>メインルート</b>		
Rp ① div		
生食	100 mL	
プロイメンド	1 A	
デキサート	6.6 mg	
	1 A	

↓ 30分

Rp ② div		
アバスチン	0 mg	
生食	100 mL	

↓ 90～30分

Rp ③ div		
生食	50 mL	

↓ 15分

Rp ④ div		
イリノテカン	0 mg	
生食	500 mL	

↓ 120分

Rp ⑤ div		
生食	250 mL	

↓ 90分

**【Day1夕～15朝】**

Rp.1 ゼローダ錠300 0 mg 2×朝夕食後 14日分

※アバスチン初回投与時は90分かけて点滴静注。初回投与時の忍用性が良好であれば2回目の投与は60分間で行ってもよい。また、2回目の投与においても忍用性が良好であれば、それ以降の投与は30分間で投与することができる。