尿路上皮がん

① GC (GEM+CDDP)療法

患者ID	：&tagPatNo&	身長	：tagPatHeight cm
患者氏名	：&tagPatName&	体重	：tagPatWeight kg
生年月日/性別	：&tagPatBirth& #### 歳 / gPatS	体表面積	：#VALUE! m^2
主治医	：&tagPatOrdDoc&		

【尿路上皮がん　投与スケジュール】１コース：4週間（28日間）

成分名	商品名・規格	標準投与量			今回の投与量		投与日
ゲムシタビン（GEM）	ジェムザール 1 g/V 200mg/V	1000mg/m^2	#VALUE!	mg/body		mg/day	day 1 8 15
シスプラチン（CDDP）	シスプラチン注 10mg/20mL/V 25mg/50mL/V 50mg/100mL/V	70mg/m^2	#VALUE!	mg/body		mg/body	day2

＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（＿）

【Day 1, 8, 15】

メインルート

Rp ① div
大塚生食 100 mL
デキサート 6.6 mg
1 A
↓ 30分

Rp ② div
大塚生食 100 mL
ジェムザール 0 mg
↓ 30分

Rp ③ div
生食 50 mL
↓ 15分

【Day 2】

メインルート

Rp ① div
ソルアセトD 500 mL
↓ 120分

Rp ② div
ソルアセトD 500 mL
↓ 120分

Rp ③ div
大塚生食 100 mL
プロイメンド 1 V
↓ 30分

Rp ④ div
大塚生食 50 mL
アロキシ 1 V
デキサート 13.2 mg
↓ 30分

Rp ⑤ div
大塚生食 500 mL
シスプラチン 0 mg
↓ 120分

Rp ⑥ div
ソルアセトD 500 mL
↓ 120分

Rp ⑦ div
マンニットール 300 mL
↓ 30分

Rp ⑧ div
ソルアセトD 500 mL
↓ 120分

2014年3月改定
筑後市立病院